






## CONDIZIONI DI BASE PER DONARE:



- Et : compresa fra 18 e 60 anni
- Pulsazioni: comprese fra 50-100 battiti/min
- Pressione arteriosa:  
massima < 180 mg di Hg  
minima < 100 mg di Hg

- Peso: pi  di 50 kg



- Stato di salute buono, intervallo minimo tra due donazioni di sangue intero   90 giorni per gli uomini e 180 per le donne.




- Valori di emoglobina:
  - HB  $\geq$  13,5 g/dL uomo
  - HB  $\geq$  12,5 g/dL donna

### ● N.B.

Documenti necessari per la donazione di sangue:  
tessera sanitaria e documento d'identit .

Presentarsi dopo una leggera colazione: th , fette biscottate/biscotti secchi.  
No latte/yogurt.


# CAUSE DI ESCLUSIONE E TEMPI:



- **RAPPORTI SESSUALI A RISCHIO** di trasmissione di malattie infettive (rapporti promiscui e/o occasionali, con persone sconosciute, cambio di partner negli ultimi 4 mesi), 4 mesi dall'ultima situazione a rischio.
- **EPATITE (B o C) O ITTERO, MALATTIE VENEREE.**
- **POSITIVITA' PER IL TEST DELLA SIFILIDE (TPHA o VDRL), PER IL TEST AIDS (anti HIV)**

NO!

- **INTERVENTI CHIRURGICI MAGGIORI, ENDOSCOPIE E ARTROSCOPIE: 4 MESI**
- **INTERVENTI CHIRURGICI MINORI (ambulatoriali): 7 GIORNI**



- **INTERVENTI ODONTOIATRICI DI MINORE ENTITA' O DI IGIENE: 48 ORE**
- **INTERVENTI ODONTOIATRICI (estrazione, devitalizzazioni): 7 GIORNI**
- **INTERVENTI ODONTOIATRICI (implantologia, innesto osseo autologo/omologo): 4 MESI**

- **TATUAGGI E PIERCING: 4 MESI**



- **AGOPUNTURA: 4 MESI**



- **PUNTURA DI ZECCA: 40 GIORNI**



- **GRAVIDANZA: 6 MESI DOPO IL PARTO**



- **ASSUNZIONE DI FARMACI ANTINFIAMMATORI: 7 GIORNI**

- **ASSUNZIONE DI CORTISONE E ANTIBIOTICI: 14 GIORNI**

- **FORME ALLERGICHE GRAVI (tranne shock anafilattico): 2 MESI**

SE HAI EFFETTUATO VIAGGI FUORI DALL' ITALIA O SEI SOGGETTO AD UNA QUALCHE ALLERGIA CONTATTA IL CENTRO TRASFUSIONALE n. 040.3992858